

MTM3112 - Álgebra Linear
Quinta Lista
Prof. Maicon Marques Alves

1. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear dada por $T(x, y, z) = (z, x - y, -z)$.
 - (a) Determine uma base para $N(T)$.
 - (b) Dê a dimensão da imagem de T .
 - (c) T é sobrejetora? Justifique.

2. Quando possível, dê exemplos de transformações lineares satisfazendo as seguintes condições:
 - (a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetora.
 - (b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ com $N(T) = \{(0, 0, 0)\}$.
 - (c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ com $Im(T) = \{(0, 0)\}$.
 - (d) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ com $N(T) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$.
 - (e) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ com $N(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = -x\}$.

3. Seja $D_1 : \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathcal{P}_3$ definida por $D_1(f) = f'$ (primeira derivada).
 - (a) Verifique que D_1 é uma transformação linear.
 - (b) Determine $N(D_1)$ e $Im(D_1)$ e encontre uma base para cada um desses subespaços.

4. Seja $D_2 : \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathcal{P}_3$ definida por $D_2(f) = f''$ (segunda derivada). Verifique que D_2 é uma transformação linear e encontre uma base para $N(D_2)$.

5. Para cada uma das transformações lineares T abaixo, determine $N(T)$, uma base para esse subespaço e verifique se T é injetora. Além disso, determine $Im(T)$, uma base para esse subespaço e verifique se T é sobrejetora. Justifique suas respostas.
 - (a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (3x - y, -3x + y)$.
 - (b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x + y, x, 2y)$.
 - (c) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x - 2y, x + y)$.
 - (d) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x - y + z)$.
 - (e) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x - y - 2z, -x + 2y + z, x - 3z)$.
 - (f) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x - 3y, x - z, z - x)$.
 - (g) $T : \mathcal{P}_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(a_0 + a_1x) = (a_1, 2a_1, a_1 - a_0)$.
 - (h) $T : M(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = (a - b, a + b)$.

6. Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(-2, 3) = (-1, 0, 1)$ e $T(1, -2) = (0, -1, 0)$.
- (a) Determine $N(T)$ e $Im(T)$.
 - (b) T é injetora? T é sobrejetora?
7. Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0, 0) = (1, -2, 1)$, $T(0, 1, 0, 0) = (-1, 0, -1)$, $T(0, 0, 1, 0) = (0, -1, 2)$ e $T(0, 0, 0, 1) = (1, -3, 1)$.
- (a) Determine $N(T)$ e $Im(T)$.
 - (b) Determine bases para $N(T)$ e $Im(T)$.
 - (c) Verifique a validade do Teorema do Núcleo e da Imagem para esse caso específico.
8. Encontre uma transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $N(T) = [(1, 0, -1)]$.
9. Encontre uma transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cujo núcleo é o subespaço gerado pelos vetores $(1, 2, -1)$ e $(1, -1, 0)$.
10. Encontre uma transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ cuja imagem é o subespaço gerado pelos vetores $(1, 3, -1, 2)$ e $(2, 0, 1, -1)$.

Gabarito Parcial

- 1 (a) $\{(1, 1, 0)\}$
(b) $\dim \text{Im}(T) = 2$
- 3 (b) $\text{Im}(D_1) = \mathcal{P}_2$ e $N(D_1) =$ polinômios constantes.
- 5 (a) $N(T) = [(1, 3)]$ e $\dim N(T) = 1$. Tem-se que T não é injetora, pois $N(T) \neq \{(0, 0)\}$.
(c) $N(T) = \{(0, 0)\}$ e $\dim N(T) = 0$. Tem-se que T é injetora pois $N(T) = \{(0, 0)\}$.
(g) $N(T) = \{0\}$ e, conseqüentemente, T é injetora.
- (h) $N(T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$. Tem-se que $\dim N(T) = 2$ e $\dim \text{Im}(T) = 2$.
- 8 $T(x, y, z) = (x + z, y)$.