

Pré-Cálculo - Lista 2

Axiomas de Ordem

Nos exercícios a seguir prove o enunciado ou estabeleça a equação pedida

- (i) $0 \leq x \Leftrightarrow -x \leq 0$
(ii) $0 < x \Leftrightarrow -x < 0$
(O oposto de um número positivo é negativo e vice-versa.)
Obs: Note que estes resultados podem ser escritos também na forma:
 $0 \leq -x \Leftrightarrow x \leq 0$
 $0 < -x \Leftrightarrow x < 0$.
Porquê?
- (i) $(0 < x) \wedge (0 < y) \Rightarrow 0 < x + y$
(A soma de dois números positivos é positivo)
(ii) $(x \leq 0) \wedge (y \leq 0) \Rightarrow x + y \leq 0$
(iii) $(x < 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow x + y < 0$
(A soma de dois números negativos é um número negativo)
- (i) $(0 < x) \wedge (0 < y) \Rightarrow 0 < x \cdot y$
(O produto de dois números positivos é um número positivo)
(ii) $(x \leq 0) \wedge (y \leq 0) \Rightarrow 0 \leq x \cdot y$
(iii) $(x < 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow 0 < x \cdot y$
(O produto de dois números negativos é um número positivo)
- $(0 < x) \wedge (y < 0) \Rightarrow x \cdot y < 0$
(O produto de um número positivo e um número negativo é negativo)
- (i) $(0 < x) \Rightarrow 0 < \frac{1}{x}$
~~O inverso de um número positivo é positivo~~
Lembre-se: $\frac{a}{b} := a \cdot b^{-1}$
(ii) $x < 0 \Rightarrow \frac{1}{x} < 0$
(O recíproco de um número negativo é negativo)
- O quadrado de qualquer número real não nulo é positivo
- $0 < 1$ (i.e. 1 é positivo)
- A equação $x^2 + 1 = 0$ não tem raiz real
- $x < y, 0 < z \Rightarrow xz < yz$ e $\frac{x}{z} < \frac{y}{z}$
(Multiplicação ou divisão de ambos os membros de uma desigualdade por um número positivo preserva a desigualdade)
- $x < y, z < 0 \Rightarrow yz < xz$ e $\frac{y}{z} < \frac{x}{z}$
(Multiplicação ou divisão de ambos os membros de uma desigualdade por um número negativo muda a desigualdade)
- $0 < x < y \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$
- $x < y, w < z \Rightarrow x + w < y + z$
- $0 < x < y, 0 < z < w \Rightarrow xz < yw$ e $x/w < y/z$
- Se x e y são dois números positivos então $x < y \Leftrightarrow x^2 < y^2$
- $x^2 + y^2 \geq 0$
 $x^2 + y^2 > 0$ a menos que se tenha $x = y = 0$
- Seja x um número fixo satisfazendo $x < \epsilon$ para todo número positivo ϵ . Então $x \leq 0$.
- Não existe nenhum número real que seja maior que todos os outros. Logo o conjunto dos números reais é infinito.
- $x < y \Rightarrow x < \frac{x+y}{2} < y$
[Obs. O número 2 é definido como $2 := 1 + 1$]
- Se $x^2 = y$ diz-se que x é a raiz quadrada de y . Pelo exercício (6), se tal número x existe então y deve ser não negativo; caso se tenha $y = 0$ então $x = 0$ é a única raiz quadrada de y . Mostre que se um número positivo y tem raízes quadradas, ele tem exatamente duas raízes, uma positiva e outra negativa.
- No axioma de corpo que garante a existência do elemento neutro multiplicativo assumimos que $1 \neq 0$. Considere uma forma modificada desse axioma como se segue
(M4*) $\exists 1 \in R, 1 \neq 0$ tal que $x \cdot 1 = x, \forall x \in R$.
Verifique se (M4*) é consistente ou não. Isto é, se (M4*) não for consistente mostre onde ocorre a inconsistência. Se (M4*) for consistente caracterize a forma do conjunto R .

21. Seja uma relação \mathcal{R}_{\subseteq} definida entre conjuntos pela regra: $A\mathcal{R}_{\subseteq}B \leftrightarrow A \subseteq B$. Verifique quais axiomas de ordem são obedecidos pela relação \subseteq .

22. Seja o conjunto das retas no plano. Seja uma relação definida da seguinte forma: *Dois retas no plano são equivalentes sss forem paralelas*. Verifique quais axiomas de ordem são verificados por essa relação.

Esses resultados podem ser escritos também na forma:

(i) $x < -x \Rightarrow x < 0$
 (ii) $x < -x \Rightarrow x < 0$
 (iii) $x < -x \Rightarrow x < 0$
 (iv) $x < -x \Rightarrow x < 0$

3. (i) $(0 < x) \wedge (0 < y) \Rightarrow 0 < x + y$
 (A soma de dois números positivos é positiva)
 (ii) $(x \leq 0) \wedge (y \leq 0) \Rightarrow x + y \leq 0$
 (iii) $(x < 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow x + y < 0$
 (A soma de dois números negativos é um número negativo)

3. (i) $(0 < x) \wedge (0 < y) \Rightarrow 0 < x \cdot y$
 (O produto de dois números positivos é um número positivo)
 (ii) $(x \leq 0) \wedge (y \leq 0) \Rightarrow 0 \leq x \cdot y$
 (iii) $(x < 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow 0 < x \cdot y$
 (O produto de dois números negativos é um número positivo)

4. $(0 < x) \wedge (y < 0) \Rightarrow x \cdot y < 0$
 (O produto de um número positivo e um número negativo é negativo)

5. (i) $(0 < a) \Rightarrow 0 < \frac{1}{a}$
 (O inverso de um número positivo é positivo. Lembrando-se: $\frac{1}{a} = a^{-1}$)
 (ii) $x < 0 \Rightarrow \frac{1}{x} < 0$
 (O inverso de um número negativo é negativo)

6. O inverso de qualquer número real não nulo é positivo

7. $0 = 1$ (com 1 é positivo)

8. A equação $x^2 + 1 = 0$ não tem raiz real

9. $x < y, 0 < z \Rightarrow xz < yz \Rightarrow \frac{x}{z} < \frac{y}{z}$
 (Multiplicação ou divisão de ambos os membros de uma desigualdade por um número positivo preserva a desigualdade)

10. $x < y, x < 0 \Rightarrow yx < xy \Rightarrow \frac{x}{y} < \frac{x}{x}$
 (Multiplicação ou divisão de ambos os membros de uma desigualdade por um número negativo inverte a desigualdade)

11. $0 < x < y \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$

12. $x < y, w < z \Rightarrow x + w < y + z$

13. $0 < x < y, 0 < u < v \Rightarrow xz < yv \Rightarrow x/v < y/z$

14. Se $x + y$ não são números positivos então $x < -y$ e $x^2 < y^2$

15. $x^2 < y^2 \Rightarrow 0 < x^2 - y^2 < 0$
 $x^2 - y^2 > 0$ e ambos que se soma $x = y = 0$

16. Seja c um número fixo satisfazendo $c < e$ para todo número positivo e . Então $x \leq 0$.

17. Não existe nenhum número real que seja maior que todos os outros. Logo o conjunto dos números reais é infinito.

18. $x < y \Rightarrow x + 1 < y + 1$
 (Se x é o número 2 e y é o número 3)

19. Se $x^2 = y$ diz-se que x é a raiz quadrada de y . Pelo exercício (b), se tal número x existe então y deve ser não negativo, caso se tenha $y > 0$ então $x = 0$ é a única raiz quadrada de y . Mostre que se um número positivo y tem duas raízes quadradas, ele tem exatamente duas raízes, uma positiva e outra negativa.

20. No axioma de ordem que garante a existência do elemento neutro multiplicativo assumimos que $1 \neq 0$. Considere uma forma modificada desse axioma como se segue:
 (M*) $\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0$ tal que $x \cdot 1 = x, \forall x \in \mathbb{R}$.
 Verifique se (M*) é consistente ou não. Isto é, se (M*) não for consistente contra onde ocorre a inconsistência. Se (M*) for consistente caracterize a forma do conjunto \mathbb{R} .

1.

$$1) 0 \leq x \iff -x \leq 0$$

(\implies) seja $0 \leq x$.

$$\text{De (I, III)} : 0 + (-x) \leq x + (-x)$$

$$\text{De } A1, A2 : -x \leq 0$$

(\impliedby) seja $-x \leq 0$

$$\text{De (I, III)} : -x + x \leq 0 + x$$

$$\text{De } A1, A2 : 0 \leq x$$

ii) (\iff)

seja $0 < x$.

Então por definição:

$$x \neq 0 \wedge 0 \leq x$$

Do resultado anterior (i) temos:

$$-x \leq 0 \quad (1)$$

Mas, já vimos que

$$-x = (-1) \cdot x \quad [\text{Ex. 25 - Lista 1}]$$

e sendo $-1 \neq 0, x \neq 0$ temos

$$-1 \cdot x \neq 0 \quad (\text{Ex. 15 - Lista 1})$$

$$\therefore -x \neq 0 \quad \underline{\underline{(2)}}$$

$$\text{De (1) e (2) : } -x \neq 0 \wedge -x \leq 0$$

\therefore

$$\underline{\underline{-x < 0}}$$

(i.e. $-x$ é negativo)

(\Leftarrow) Seja $-x < 0$.

$$\text{Então, } -x \neq 0 \wedge -x \leq 0$$

Do resultado anterior (d.i) :

$$\underline{\underline{-x \leq 0}} \Rightarrow \underline{\underline{0 \leq x}} \quad \underline{\underline{(1)}}$$

Mas

$$x = (-1) \cdot (-x)$$

$$\therefore \underline{\underline{(2)}} \quad x \neq 0 \quad (\text{pois } -1 \neq 0, -x \neq 0 \text{ e } (-1) \cdot (-x) \neq 0)$$

De (1), (2) :

$$x \neq 0, 0 \leq x$$

$$\underline{\underline{0 < x}}$$

\therefore (x é positivo)

2. Ex 2

(i) seja $(0 < x) \wedge (0 < y)$.

\therefore

$$x \neq 0 \quad (1)$$

$$0 \leq x \quad (2)$$

$$y \neq 0 \quad (3)$$

$$0 \leq y \quad (4)$$

$$\text{De (2), (4) e (I, III)} : 0 \leq x + y \quad (5)$$

$$\text{Suponha } x + y = 0 \quad (6)$$

$$\therefore x = -y$$

De (4) e resultado \pm (i)

$$0 \leq y \Rightarrow -y \leq 0$$

$$\therefore x \leq 0$$

o que contraria (2).

Logo a suposição feita em (6) é falsa,

i.e. devemos ter $x + y \neq 0$ (7)

Re (5) e (7) :

$0 < x+y$

$(x > 0) \vee (y > 0)$

- (1) $0 \neq 0$
- (2) $0 \neq 0$
- (3) $0 \neq 0$
- (4) $0 \neq 0$

De (2) e (4) e (I, III) ; $0 \neq x+y$ (2)

(5) $x+y=0$

De (1) e (3) e (II, IV)

$0 \neq y \Rightarrow -y \neq 0$

$\therefore x \in 0$

Logo a proposição verdadeira em (c) e falsa!
Logo a proposição verdadeira em (d) e falsa!
Logo a proposição verdadeira em (e) e verdadeira!

2.

i) Sejam $x, y \in \mathbb{R}$, $+y$. $x \leq 0$ (1)
 $y \leq 0$ (2)

De (1) e de (I, III) :

$$x + y \leq 0 + y \quad (3)$$

De (3) e A1 :

$$x + y \leq y \quad (4)$$

De (4), (2), 04 :

$$x + y \leq 0$$

ii) Sejam $x, y \in \mathbb{R}$ negativos, i.e.,

$$x < 0$$

$$y < 0.$$

$$\text{Mas } x < 0 \iff x \neq 0 \wedge x \leq 0 \quad (1)$$

$$y < 0 \iff y \neq 0 \wedge y \leq 0 \quad (2)$$

De (1), (2) e do resultado anterior temos

$$x + y \leq 0 \quad (3)$$

Suponha que $x + y = 0$

Contra de A.2 :

$$y = -x.$$

Mos, se x é negativa temos
 $-x$ é positivo (Ex. 1),

$\therefore y$ é positivo

o que contraria a hipótese de
que y é negativa.

Logo a suposição de que $x + y = 0$
é falsa,

$$\therefore x + y \neq 0 \quad (4)$$

De (3) e (4) :

$$x + y < 0.$$

A soma de dois números negativos
é um número negativo

3.

(i) Sejam $x, y \in \mathbb{R}$, x, y positivos.

Então:

$$x \neq 0 \wedge 0 \leq x$$

$$y \neq 0 \wedge 0 \leq y$$

De (II, III):

$$\textcircled{*} \quad 0 \leq x \cdot y$$

Mas $x \neq 0$ e $y \neq 0$

$$\therefore \textcircled{**} \quad x \cdot y \neq 0 \quad (\text{Ex. 15 - Lista 1})$$

De $\textcircled{*}$ e $\textcircled{**}$:

$$0 < x \cdot y$$

$\therefore x \cdot y$ é positivo.

3.

ii) Seja $x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq 0$,
 $y \leq 0$.

Mas do Ex. 1:

$$x \leq 0 \Rightarrow 0 \leq -x$$

$$y \leq 0 \Rightarrow 0 \leq -y$$

De (II, III):

$$0 \leq (-x)(-y)$$

Mas $(-x)(-y) = x \cdot y$ (Ex. 26 - Lista 1)

$$\therefore 0 \leq (-x)(-y) = x \cdot y$$

$$\therefore 0 \leq x \cdot y.$$

iii) sejam x, y negativos.

$$\text{Então } x \neq 0, x < 0$$

$$y \neq 0, y < 0$$

De (3.i) temos :

$$x < 0 \wedge y < 0 \Rightarrow 0 < x \cdot y \quad (1)$$

Mos do ex. 15 - lista 1 :

$$x \neq 0 \wedge y \neq 0 \Rightarrow x \cdot y \neq 0 \quad (2)$$

De (1) e (2) :

$$0 < x \cdot y$$

$\therefore x \cdot y$ é positivo

4.

$$\text{ seja } 0 < x \wedge (y < 0)$$

$$\therefore 0 < x \iff x \neq 0 \quad (1)$$

$$0 \leq x \quad (2)$$

$$y < 0 \implies 0 < -y \quad (\text{Res. Anterior})$$

$$\therefore -y \neq 0 \quad (3)$$

$$0 \leq -y \quad (4)$$

$$\text{ De } (2), (4), (I, II)$$

$$0 \leq x(-y) = - \quad (5)$$

$$\text{ Mas } x(-y) = -x \cdot y \quad (6) \quad (\text{Resultado anterior})$$

De (5) e (6) :

$$0 \leq -(x \cdot y)$$

$$\therefore 0 + x \cdot y \leq -(x \cdot y) + x \cdot y \quad (\text{Result. Ant.})$$

$$x \cdot y \leq 0 \quad [A.1, A.2]$$

(7)

$$\text{ De } (1), (3) : x \cdot (-y) \neq 0 \quad (\text{Resultado anterior})$$

$$\therefore -(x \cdot y) = x(-y) \neq 0$$

$$\therefore (x \cdot y) \neq 0 \quad (\text{se } -x \neq 0 \Rightarrow x \neq 0)$$

De (7), (8) :

$$\underline{0 < x \cdot y < 0}$$

$$(i) \quad 0 < x < 0$$

$$(ii) \quad x < 0$$

(i), (ii), (iii), (iv)

$$0 < x(-x) < 0$$

$$(i) \quad x \cdot y = x(-x) < 0$$

$$0 < x \cdot y < 0$$

$$0 + x \cdot y = -(x \cdot y) + x \cdot y$$

$$0 < x \cdot y < 0$$

$$0 < x \cdot y < 0$$

5.

(i) seja $0 < x$

$\therefore x \neq 0$ (1)

$0 \leq x$ (2)

De (1) e M2 :

$\exists x^{-1} \in \mathbb{R}$ tq. $x \cdot x^{-1} = 1$. (3)

Logo $x^{-1} \neq 0$ (Ex. 16 (a) Lista 4) (4)

Suponha $x^{-1} \leq 0$. (*)

Então $0 \leq -x^{-1}$ (Resultado anterior) (5)

De (2), (5), (II, III) :

$0 \leq x(-x^{-1})$ (6)

Logo $x \cdot (-x^{-1}) = -(x \cdot x^{-1}) = -1$ (7)

De (6) e (7) :

$0 \leq -1$

$0 \leq -1$ (Resultado anterior)

$1 < 0$ (pois $1 \neq 0$)

o que é absurdo.

Logo (A) é falsa, i.e. devemos ter

$$0 \leq x^{-1} \quad (8)$$

De (4) e (8) :

$$0 < x^{-1}$$

Mas $x^{-1} = 1 \cdot x^{-1} \equiv \frac{1}{x}$ (definição)

$$\boxed{0 < \frac{1}{x}}$$

5ix) Seja $x < 0$.

$$\text{Então } 0 < -x \quad (\text{Resultado})$$

$$\circ \circ \quad 0 < \frac{1}{-x} \quad (\text{Resultado})$$

$$\text{Mas } \frac{1}{-x} \equiv -\frac{1}{x} \quad (\text{Resultado})$$

$$\therefore 0 < -\frac{1}{x}$$

$$\therefore 0 + \frac{1}{x} < -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} \quad [\text{Resultado}]$$

$$\frac{1}{x} < 0 \quad [A. 2]$$

6. Seja $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$. (1)

De 04 ter-se:

$$0 \leq x \vee x \leq 0 \quad (2)$$

De (1) e (2) temos os seguintes casos possíveis:

(*) $x \neq 0 \wedge 0 \leq x$

(**) $x \neq 0 \wedge x \leq 0$

(***) $x \neq 0 \wedge (0 \leq x \wedge x \leq 0)$

• De 02: Se $0 \leq x \wedge x \leq 0$ então $x = 0$

Mas devemos ter $x \neq 0$, logo o caso (***) não ocorre.

• Seja o caso (*):

$$x \neq 0 \wedge 0 \leq x \quad (3)$$

• $0 < x$ (Definição de $<$)

• $0 < x^2$ (O produto de dois números positivos é positivo)
 x^2 é positivo (3)

• Seja o caso (**):

$$x \neq 0 \wedge x \leq 0$$

Por definição de $<$

$$x < 0$$

$\therefore 0 < x^2$ (o produto de dois números negativos é positivo)

$\therefore x^2$ é positivo (u)

De (z), (u)

x^2 é positivo

7. Seja $1 \in \mathbb{R}$ o elemento neutro multiplicativa.

De M_1 :

$$1 \neq 0$$

$$\therefore 0 < 1 \cdot 1 \quad (\text{Ex. 5})$$

$$\text{Mas } 1 = 1 \cdot 1$$

$$\therefore 0 < 1 \cdot 1 = 1$$

$$\therefore 0 < 1$$

$$\therefore \underline{1 \text{ é positivo}}$$

8,

Seja $x \in \mathbb{R}$.

Podemos ter $x=0$ ou $x \neq 0$.

→ Suponha $x=0$.

Então

$$x^2 = x \cdot x = 0 \cdot 0 = 0 \quad (\text{Ex. 13 - Lista 1})$$

$$\therefore x^2 + 1 = 0 + 1$$

$$\underline{(1)} \quad x^2 + 1 = 1 \quad [A.1]$$

Mas de M1:

$$\underline{(2)} \quad 0 \neq 1$$

De (1) e (2) : $x^2 + 1 \neq 0$, se $x=0$.

(3)

→ Suponha $x \neq 0$.

Então

(4)

$$0 < x^2 \quad (\text{Ex. 5 - Lista 2})$$

Também

(5)

$$0 < 1 \quad (\text{Ex. 6 - Lista 2})$$



D₃ (I, III)

$$0 < x^2 + 1$$

(A soma de dois números positivos é positiva)

$$x^2 + 1 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0$$

(6)

De (3) e (6):

$$x^2 + 1 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$1 = -x^2 \quad (1)$$

$$1 \neq 0$$

$$0 \neq -x^2, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$0 < x^2, \forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0$$

$$0 < x^2, \forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0$$

11.

Let

$$0 < x < y \quad (1)$$

$$\exists x^{-1}, 0 < x^{-1} \quad [5i]$$

De $\exists x^{-1}$:

$$0 < x \cdot x^{-1} < y \cdot x^{-1}$$

$$0 < 1 < y \cdot x^{-1} \quad [M2]$$

$$\exists y^{-1}, 0 < y^{-1} \quad [5i]$$

De $\exists y^{-1}$:

$$0 < y^{-1} \cdot 1 < y^{-1} (y \cdot x^{-1})$$

$$y^{-1} < (y^{-1} \cdot y) \cdot x^{-1} \quad [M3]$$

$$y^{-1} < 1 \cdot x^{-1} \quad [M2]$$

$$y^{-1} < x^{-1} \quad [M1]$$

$$\frac{1}{y} < \frac{1}{x} \quad [\text{Resultado}]$$

13.

$$\text{Seja } 0 < x < y \quad (1)$$

$$0 < z < w \quad (2)$$

$$\therefore 0 < z \text{ e } 0 < y \quad (3)$$

De (1), (3), Ex. 9 :

$$0 < xz < yz \quad (4)$$

De (2), (3), Ex. 9 :

$$0 < yz < yw \quad (5)$$

(3), (5), Resultado :

$$0 < xz < yw \quad .$$

21.

$$A R_{\subseteq} B \leftrightarrow A \subseteq B$$

01. $\forall A$ conjunto, $A \subseteq A$

$$\therefore A R_{\subseteq} A$$

i.e. 01 é verificada

02. Seja $A R_{\subseteq} B$ e $B R_{\subseteq} A$

$$\therefore A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A$$

$$\therefore A = B$$

\therefore 02 é verificada

03. Seja $A R_{\subseteq} B$ e $B R_{\subseteq} C$.

$$\therefore A \subseteq B \text{ e } B \subseteq C$$

Então $A \subseteq C$

\therefore 03 é verificada

04. Seja A, B conjuntos

se A e B forem disjuntos não

tem - 21 $A \not\subseteq B$ nem $B \not\subseteq A$

Logo $A \not\subseteq B$ e $B \not\subseteq A$

∴ 04 mod é verificado

22.

Sejam π e τ retas no plano.

$\pi R_{\parallel} \tau \iff \pi$ e τ são retas
paralelas

01. $\pi \parallel \pi, \neq \pi$


$\therefore \pi R_{\parallel} \pi$

\therefore OI é verificada

02. Sejam $\pi_1 R_{\parallel} \pi_2$ e $\pi_2 R_{\parallel} \pi_1$

$\therefore \pi_1 \parallel \pi_2$ e $\pi_2 \parallel \pi_1$

No entanto não é necessário
que se tenha $\pi_1 = \pi_2$



03. Sejam $\pi_1 R_{\parallel} \pi_2$ e $\pi_2 R_{\parallel} \pi_3$

$\therefore \pi_1 \parallel \pi_2$ e $\pi_2 \parallel \pi_3$

$\therefore \pi_1 \parallel \pi_3$
 $\therefore \pi_1 R_{\parallel} \pi_3$

\therefore 03 é verificado

04. k Jam r_2 e s duas retas
no plano.



em qual modo se

tem

$r_2 \parallel s$, $r_2 \cap s = \emptyset$

\therefore 04 med é satisfeito.